

Si <2ans (min 3mois)

MEDICAMENTS	Age	Poéologie et mode d'administration	Délai et administration	Contre indications
Chloral Rectal CHUV - solution - 100 mg/ml (hydrate de chloral) de 3 mois à 2ans	1 mois minimum 5 ans maximum ou 20 kg	Rectal 75mg / kg + 25 mg / kg en réserve (Dose maximum: 2000 mg) 1 gr max/jour pour nourissons 2gr max/jour pour enfants Meilleure absorption orale que rectale. Adjonction d'eau dans la préparation rectale /per os pour diminuer l'irritabilité du produit (lait pas plus efficace que l'eau) Choix entre rectal et per os selon préférence du patient ou de ses parents	30 à 45 min avant heure de l'examen Préparation rectale : administration à l'aide d'une sonde rectale en position latérale gauche. Il est parfois nécessaire de maintenir les fesses serrées pour éviter que le liquide ne s'échappe pas immédiatement après l'administration Si le patient a des selles immédiatement après l'administration: avertir médecin prescripteur et évaluer de la nécessité d'une nouvelle dose	Insuffisance hépatique ou rénale sévère, affections cardiaques, insuffisance respiratoire, porphyrie, gastrite, apnée obstructive du sommeil, neutropénie

Si >2ans (max 5ans):

Truxal® (chlorprothixène)	> 2 ans jusqu'à 5ans (25 mg/kg) + Chloral 75mg/kg (+ 25mg/kg) (pas de réserve!)	per os 1mg/kg	45min à 1h avant l'examen Possibilité d'écraser le/les comprimé(s) pour faciliter son administration	Allongement de l'intervalle QT, troubles cardiaques cliniquement significatifs
-------------------------------------	--	------------------	---	--

Examen du patient

- Ascultation
- Etat général
- Rhume, Toux
- Etat fébrile ?